

# Etat des lieux de la nidification des espèces d'intérêts communautaires ZPS des Boucles de la Marne (RNR du Grand-Voyeux – Parc naturel du Pâtis) 2015-2019



Espèces d'intérêts communautaires Annexe I Directive Oiseaux ZPS des Boucles de la Marne	Enjeux de conservation ZPS des Boucles de la Marne (d'après DOCOB)	Nidification sur la RNR du Grand-Voyeux			Nidification sur le Parc naturel du Pâtis		
		Régulière	Occasionnelle	De passage	Régulière	Occasionnelle	De passage
Oedicnème criard	Fort	X					
Sterne pierregarin	Fort	X			X		
Blongios nain	Fort	X			X		
Butor étoilé	Fort			hivernation			hivernation
Gorgebleue à miroir	Fort	X					X
Mouette mélanocéphale	Fort		X				X
Busard des roseaux	Non évalué	X					
Pie-grièche écorcheur	Assez fort						
Milan noir	Assez fort			X			
Pic noir	faible	X				X	
Martin-pêcheur d'Europe	Faible			X			X
Bondrée apivore	Faible			X			

# Une saison de nidification sur la RNR du Grand-Voyeux - 2019

- 10<sup>ème</sup> année consécutive de nidification du couple de Busard des roseaux → 0 *juvéniles volants*
- Population stable pour la Gorgebleue à miroir → 6 à 8 *mâles chanteurs*
- Echec de nidification pour la Sterne pierregarin → 0 *juvéniles à l'envol*
- Nidification probable du Blongios nain → 1 à 2 *couples probables*
- Absence d'Oedicnème criard en période de nidification

Espèces non retenues dans l'Annexe I mais d'intérêts patrimoniaux :

- Rousserolle turdoïde : 1 à 2 couples probables
- Locustelle lusciniôïde : 1 couple probable

Busard des roseaux, juvénile – août 2014 – R.Huchin (AVEN)



Gorgebleue à miroir – 2014 – R.Huchin (AVEN)





Sources : Google Satellite 2016, AVEN 2018 (Cetta 2018)

0 200 400 m

## Observations de la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) sur la RNR du Grand-Voyeux saison de nidification 2018

Carte réalisée sous QGIS 2.14.19 - novembre 2018  
AVEN du Grand-Voyeux


- chant en période de nidification
- transport sacs fécaux ou nourriture




## Au fil des jours sur la RNR du Grand-Voyeux – Etat des populations et tendances évolutives

<b>Espèces Nat2000</b>	<b>Nb couples 2016</b>	<b>Nb couples 2017</b>	<b>Nb couples 2018</b>	<b>Tendance</b>
<b>Blongios nain</b>	<b>1 à 2</b>	<b>1 à 3</b>	<b>0 à 3</b>	
<b>Busard des roseaux</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Gorgebleue à miroir</b>	<b>4 à 8</b>	<b>4 à 6</b>	<b>4 à 8</b>	
<b>Pic noir</b>	<b>0 à 2</b>	<b>0 à 1</b>	<b>0 à 1</b>	
<b>Mouette mélanocéphale</b>	<b>0 à 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oedicnème criard</b>	<b>1</b>	<b>1 à 2</b>	<b>0 à 1</b>	
<b>Sterne pierregarin</b>	<b>7 à 9</b>	<b>3 à 4</b>	<b>2 à 4</b>	
<b>Milan noir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Butor étoilé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pie-grièche écorcheur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Martin-pêcheur d'Europe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bondrée apivore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


# Au fil des jours sur la RNR du Grand-Voyeux – Remarques



- Baisse significative de la fréquentation du site par l'Oedicnème criard



- Population stable pour la Gorgebleue à miroir



- Baisse des contacts du Butor étoilé en période d'hivernage

- Présence régulière du Pic noir – Nidifications probables (Ile de l'Ancre, Remise de l'Aile)
- Nidification de la Mouette mélanocéphale en 2016 (Comportements territoriaux, parades, couvaisons)
- Nidification régulière du Blongios nain : juvéniles en 2016 et 2017, probables en 2015, 2018 et 2019
- Succès variables pour la Sterne pierregarin : 3 à 7 juvéniles volants (2014, 2016, 2017, 2018), aucun juvénile volant (2015, 2019)...

# Une saison de nidification sur le Parc naturel du Pâtis (Meaux) - 2019

- Nidification probable du Blongios nain
  - Observations le 4 juin (mâle), puis 4 juillet (couple)
  - un individu tardif le 3 octobre
- Nidification de la Sterne pierregarin
  - 3 à 4 couples nicheurs
  - 1 seul poussin observé



Espèces non retenues dans l'Annexe I mais d'intérêts patrimoniaux :

- Bouscarle de cetti : 1 à 2 couples probables
- Pic épeichette : 1 couple probable

## Au fil des jours sur le Parc naturel du Pâtis – Remarques

- Présence régulière du Pic noir – Nidifications occasionnelles probables
- Présence régulière du Martin-pêcheur d'Europe – Nidifications en bords de Marne
- Observation d'un mâle Gorgebleue à miroir en période de nidification (2015)
- Observations régulières du Butor étoilé en période d'hivernage



Pic noir – 2013 – R.Huchin (AVEN)

- Observations chaque années du Blongios nain en période de nidification (depuis 2015) – Nidifications probables (1 à 2 couples)
- Bastion important pour la nidification de la Sterne pierregarin à l'échelle de la ZPS : 6 à 10 couvaisons (2015, 2016, 2017), 3 à 4 couvaisons (2018, 2019)